

衡糖舒治疗非胰岛素 依赖型糖尿病 620 例

付太旺 朱英普 韩书祥 王建平
(河北省衡水市卫生学校门诊部 053000)

我们采用自行研制的中药制剂衡糖舒治疗非胰岛素依赖型(I型)糖尿病 620 例,取得了良好的临床效果。报告如下。

1 一般资料

本组 620 例,均符合 1985 年世界卫生组织(WHO)确定的 I 型糖尿病诊断标准。其中,男 382 例,女 238 例;年龄最小 28 岁,最大 73 岁;病程最长者 35 年,最短者 1 年;空腹血糖最高者 26.2mmol/L,最低者 8.6mmol/L;尿糖最高(++++) ,最低者(++) ;合并肾病 198 例,合并眼底改变 211 例,合并高血压 98 例,合并心脏病 20 例,合并周围神经病变 126 例,合并阳痿 2 例。

2 治疗方法

衡糖舒药物组成:黄芪 30g,生石膏 15g,玉竹 15g,黄连 10g,山药 20g,天花粉 20g,玄参 12g,枸杞子 12g,菟丝子 20g。将上述药物烘干,粉碎后装入空心胶囊。每次服 2g,日 3 次,或在医生指导下用药。

3 疗效判定与效果

显效:症状基本消失,空腹血糖<8mmol/L 397 例,占 64%;有效:症状明显减轻,空腹血糖 8~10mmol/L 167 例,占 27%;无效:症状与空腹血糖无变化 56 例,占 9%。总有效率 91%。

4 典型病例

孙某,男,51 岁,干部。1996-08-12 就诊。口渴,多饮,多食,多尿,消瘦,周身乏力,面无光泽,浮肿。经放免仪检查确诊为 I 型糖尿病。空腹血糖 18.8mmol/L,尿糖(++++) ,尿酮体(+),微球蛋白(+). 给予口服衡糖舒,每次 2g,每日 3 次,同时服用河南同济肾病研究中心研制的肾特灵治疗糖尿病肾病。经过 20 天治疗,患者症状明显好转,化验空腹血糖为 7.6mmol/L,尿糖(-),尿酮体(-),微球蛋白(+),继续服用衡糖舒、肾特灵 30 日,症状消失,微球蛋白(-)。

5 讨论

中医认为,糖尿病的根本病因在肾虚,肾本不足,气阴两虚,燥热内生,耗气伤阴,阴虚则燥,积湿燥热导致肺、脾、肾、三焦脏腑功能失调而引起消渴。方中黄芪、山药健脾益气,补气扶阳;玉竹、天花粉、玄参养阴清热;黄连、生石膏清热泻火,除烦止渴;枸杞子、菟丝子补肝肾。现代药理分析,黄连、黄芪、山药、天花粉、玄参有降血糖作用,有促进胰岛功能恢复的作用。

(收稿日期:1997-12-05;修回日期:1998-01-09)

消疔汤外洗治疗 阴囊血疝 58 例

葛建立 袁 军(河北省中医院 050011)
汪建平(石家庄钢厂医院 050031)

我们 1987~1997 年自拟消疔汤加减外洗治疗阴囊血疝 58 例,取得满意疗效,兹报告如下。

1 一般资料

58 例中因外伤所致者 32 例,由腹股沟部手术引起者 26 例。其中年龄最小者 3 岁,最大者 69 岁。初诊距发病时间最短者 1h,最长者 40d。均以阴部外伤或手术后出现阴囊肿大,坠胀疼痛为主要表现。

2 治疗方法

2.1 消疔汤组成 桃仁 15g,红花 15g,苏木 9g,乳香 15g,没药 15g,泽泻 12g,猪苓 30g,冬瓜皮 30g。

2.2 煎洗法 诸药以文火共煎 20min,取汁 1000ml,每日湿敷外洗 3 次,每次 30min。发病未超过 24h 者冷湿敷,超过 24h 者热湿敷。每日 1 剂。

2.3 加减法 发病之初疑有继续出血者,原方桃仁、红花减量,加仙鹤草 30g,白及 30g;病程较长者加三棱 15g,莪术 15g;局部红肿热痛并伴有发热者,加黄柏 30g,蒲公英 30g,牡丹皮 15g。

3 治疗结果

58 例中疗程最长者 40d,最短者 7d,其中痊愈(阴囊肿大、坠胀完全消失)47 例,占 81%;好转(阴囊肿胀明显减轻,但活动时仍有坠痛)9 例,占 15.4%;无效(用药 1 周肿痛不减,而做引流手术)2 例,占 3.6%。总有效率为 96.4%。

4 典型病例

郭某,男,17 岁,学生。1995-09-12 初诊。患者于 2h 前踢球时不慎被踢伤阴部,自觉阴囊坠胀疼痛,并向小腹放射,自服止痛药物无效而来诊。查双侧阴囊肿大,以右侧为甚,皮肤皱纹消失,有瘀斑,按之疼痛,阴囊内有波动感。诊为阴囊血疝。予消疔汤加减外洗。原方加仙鹤草 30g,白及 15g,侧柏叶 15g,水煎取汁 1000ml,冷却后湿敷外洗。用药 2 剂肿痛明显减轻,再改用消疔汤原方热敷外洗,1 周后阴囊肿痛全消,复用 4 剂巩固治疗痊愈。

5 体会

血疝乃血液不循常道,流滞阴囊之意。系由阴部外伤或手术创伤导致络破血溢,津液外渗,留滞阴囊所致。正如《儒门事亲》所说:“血疝……气血流溢,渗入疝囊,留而不去”而成。故其治疗宜活血渗湿,消肿止痛。消疔汤方中桃仁、红花、苏木活血化瘀;乳香、没药既能活血,又能理气止痛;泽泻、猪苓、冬瓜皮皆具渗湿利水之功。诸药合用,煎汤局部湿敷外洗,使药力直达病所,则肿痛必除。

(收稿日期:1998-01-18)